

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LP 26 - 4 - 774 13301

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Villa Blanche - 62, Avenue Nationale - La Neuville, 51100 REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 94 - 22 Avril 1977

Abonnement annuel : 50 F

ARBORICULTURE FRUITIÈRE

## Tavelure du pommier et du poirier

Si la végétation n'a guère évolué depuis 15 jours, particulièrement dans les Ardennes, le stade des arbres est nettement plus avancé dans la vallée de la Marne, et l'Aube. Les pluies du début du mois ont pu provoquer quelques contaminations sur les variétés les plus précoces ; des premières taches, difficiles à déceler (ne pas les confondre avec des nécroses dues au froid) sont susceptibles d'apparaître dans la première semaine de mai. Nous conseillons un nouveau traitement en tenant compte de la date de la dernière intervention, des pluies survenues depuis (plus de 25 mm) et surtout de l'état végétatif des arbres.

## Oïdium du pommier

Tout relèvement des températures est favorable au champignon, surveiller les variétés les plus sensibles et incorporer à toutes bouillies un anti-oïdium.

## Monilia sur griottes, cerisiers et pruniers

Dans certaines situations, les dégâts dus au froid sont graves et la fructification des arbres est très compromise. Le Monilia étant, à cette époque, un champignon des pousses herbacées, il faut assurer malgré tout une nouvelle protection des arbres.

Chenilles diverses : Surveiller attentivement les arbres de toutes espèces ; nous avons remarqué sur pruniers des dégâts maintenant bien visibles dus à la cheimatoïdie.

## Pucerons

Variétés à surveiller : Reine des Reinettes (Puceron cendré).

Sur mirabelles, il est trop tôt pour intervenir sur le Puceron vert ; attendre la chute totale des pétales et effectuer un traitement aphicide systémique dès que l'on constatera les premières colonies.

Araignées Rouges : Il est trop tôt pour intervenir, situation inchangée.

## GRANDE CULTURE

## Charançon des siliques sur colza d'hiver

A la faveur de l'élévation des températures, les populations du charançon des siliques sont en augmentation sur colza d'hiver.

Il est rappelé qu'une intervention insecticide ne se justifie que si l'on observe en moyenne au moins un insecte par hampe florale lorsque les concentrations de l'insecte sont achevées (ce qui n'est pas encore le cas).

Compte-tenu des populations extrêmement faibles observées l'an dernier, il est peu probable que ce seuil soit atteint.

P. 179